

Co je posloupnost? Funkce $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

$$a(n) = a_n$$

$$(a_n)_{n=1}^{\infty}$$

rostoucí: $\forall n \in \mathbb{N}: a_n < a_{n+1}$

$\forall$ rostoucí je neklesající

neklesající: $a_n \leq a_{n+1}$

$\forall$ klesající je klesající

klesající: $a_n > a_{n+1}$

rostoucí: $a_n \geq a_{n+1}$

konstantní: $a_n = a_{n+1}$

Určete typ monotonie:

1) $a_n = \sin(n \cdot \pi)$

2) $b_n = 2n + (-1)^n$

3) $c_n = \frac{n-1}{n+1}$

4) $d_n = \frac{n+1}{\sqrt{n^2+2n+2}}$
 $(n+1)^2+1$

a) konstantní

b) neklesající $1, 5, 5, 9, 9, \dots$

c) $\frac{n+1-2}{n+1} = 1 - \frac{2}{n+1}$

$\frac{1}{n}$ - klesající

$\frac{2}{n+1}$ také klesající

Rostoucí

$1 - \frac{2}{n+1}$ musí být rostoucí

(na začátku odčítá nejvíce, pak pořád méně)

- zároveň pro $n=1$ je definováno.

d) $\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} < \frac{n+1}{\sqrt{n^2+1+1}}$ - proto rostoucí

$\forall n: n_n < n_{n+1}$

$n \cdot \sqrt{(n+1)^2+1} < (n+1) \cdot \sqrt{n^2+1}$

$n^2 \cdot ((n+1)^2+1) < (n+1)^2 \cdot n^2+1$

$n^2(n^2+2) < (n^2+1) \cdot (n^2+1)$

$$n^2 \neq (n+1)^2$$

$$n^4 + 2n^2 \neq n^4 + n^2 + n^2 + 1$$

$$2n^2 \neq 2n^2 + 1$$

Limita posloupnosti (a_n) :

$$a_n \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n > n_0 : |a_n - L| < \varepsilon$$

Určete limitu

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0 \quad \frac{1}{\varepsilon} < \sqrt{n} \quad \frac{1}{\varepsilon^2} < n$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

$$d) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n+1} = 1$$

$$\varepsilon > 0 \quad n \geq n_0 \quad \frac{1}{n} < \varepsilon$$

$$\frac{1}{\varepsilon} < n$$

$$n_0 = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$$

Posloupnost A je podposloupností B

- pokud má posloupnost limitu,
její podposloupnosti je má stejnou

Posloupnost C je podposloupností A.

$$\frac{(n+1)-2}{(n+1)} = 1 - \frac{2}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1) + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{n+1} \right) = 1 + 0 = 1$$

to je podposloupnost $\frac{1}{n}$

Společně limitu pos.

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{n^3 - n} = \frac{\lim (2n^2 + 1)}{\lim (n^3 - n)} = \frac{\infty}{\infty} \quad \text{není definováno}$$

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2} (2n^2 + 1)}{\frac{1}{n^3} (n^3 - n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n} + \frac{1}{n^3}}{1 - \frac{1}{n^2}} = \frac{0 + 0}{1 - 0} = 0$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{n^2 - 1} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{n^2}}{1 - \frac{1}{n^2}} = \frac{2 + 0}{1 - 0} = 2$$

$$b' = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{n - 1} = \frac{2n + \frac{1}{n}}{1 - \frac{1}{n}} = \frac{\infty + 0}{1 - 0} = \infty$$

$$\rightarrow \frac{2 + \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}} = \frac{2 + 0}{0 - 0} \quad \text{není definováno}$$

$$\frac{3}{2} - \frac{2}{3} = \frac{9}{6} - \frac{4}{6}$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^3}}{\sqrt[n]{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{3}{2}}}{n^{\frac{2}{3}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{5}{6}} = +\infty \quad \text{není definováno}$$

proč?

hledám moc pro ε , za kterou to bude vždy
 $|a_n - A| < \varepsilon$

$$n^{\frac{5}{6}} > K$$

$$\frac{5}{6} \log n > \log K$$

$$n > n^{\frac{6}{5}}$$

$$d) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n - 3^n}{5^n + 3^n} = \frac{\frac{1}{5^n} (5^n - 3^n)}{\frac{1}{5^n} (5^n + 3^n)} = \frac{1^n - \left(\frac{3}{5}\right)^n}{1^n + \left(\frac{3}{5}\right)^n} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$$

e) $q \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = ?$$

$$q > 1 \Rightarrow \lim q^n = +\infty$$

$$q = 1 \Rightarrow \lim q^n = 1$$

$$0 \leq q < 1 \Rightarrow \lim q^n = 0$$

$$-1 < q < 0 \Rightarrow \lim q^n = 0$$

$$q \leq -1 \Rightarrow \lim q^n = \text{neexistuje}$$

$$\left. \begin{array}{l} q > 1 \\ q = 1 \\ 0 \leq q < 1 \\ -1 < q < 0 \end{array} \right\} q \in (-1, 1)$$

zároveň limitát na sudých
a lichých číslech. Tedy
sudá a lichá postupnost
má odlišnou limitu.