

# 1) Existence $\mathbb{R}$ :

→ Úplnost:  $\forall$  neprázdná a shora omezená podmnožina má supremum.

Existuje jediné úplné uspořádané těleso  $\mathbb{R} = (\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, +_{\mathbb{R}}, \cdot_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}})$ .

# 1) Základní věta algebry:

Každý nenulový komplexní polynom  $p(z) \in \mathbb{C}[z]$  má kořen  $z_0 \in \mathbb{C}$ :  $p(z_0) = 0$ .

# 2) O posloupnostech:

Nechť  $(a_n) \subset \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}^*$ . Platí:

1) Existuje  $(b_n) \leq (a_n)$  a  $(b_n)$  má limitu

2) Posloupnost  $(a_n)$  nemá limitu  $\Leftrightarrow (a_n)$  má dvě podposl. s různými limitami

3) Nemí pravdy, že  $\lim a_n = A \Leftrightarrow$  existuje  $(b_n) \leq (a_n)$  a  $\lim(b_n) \neq \lim(a_n)$

# 2) Existence monotónní podposloupnosti:

$\forall (a_n) \subset \mathbb{R}$  má monotónní podposl.

# 3) Geometrická posloupnost

Pro číslo  $q \in \mathbb{R}$ :  $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} = 0 & |q| < 1 \\ = 1 & q = 1 \\ = +\infty & q > 1 \\ \text{neexistuje} & q \leq -1 \end{cases}$

# 3) liminf, limsup

$\forall (a_n) \subset \mathbb{R}$  je  $H(a_n)$  neprázdná a má v lin. uspořádaném  $(\mathbb{R}^*, <)$  min. a max.

→ Množím hraničních bodů posl.  $(a_n)$  —  $a$  je hraniční bod, pokud je limitou podposloupnosti

# 4) O harmonických číslech:

Pro  $n \in \mathbb{N}$  uvažme harm. čísla  $= \sum_{j=1}^n \frac{1}{j}$ .

1)  $\forall n \in \mathbb{N}$ :  $h_n = \log n + \gamma + \Delta_n$ , kde  $\gamma = 0,57721$  (Eulerova konst.),  $|\Delta_n| < \frac{1}{n}$  a všechny  $n$  pro něj platí  $\epsilon$

2)  $h_n \in \mathbb{N} \Leftrightarrow n = 1$

# 4) Riemannova věta

Nechť  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  je index typu  $1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \dots$ , nechť platí:

Pak  $\forall s \in \mathbb{R}^* \exists \pi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , že:

$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)} = s \rightarrow$  tedy že existují libovolné reálné součty.

1)  $\lim a_n = 0$

2)  $\sum a_{2n} = +\infty$  liché čísla

$\sum a_{2n} = -\infty$  sudé čísla

### 5) O riemannově funkci:

Riemannova funkce je spojitá právě jenom v iracionálních číslech.

$$r(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, \text{ je v zjednodušené formě} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

### 5) Limita složené funkce:

Nechť  $A, U, L \in \mathbb{R}^*$ ,  $M, N \subset \mathbb{R}$ ,  $A$  je lim. bod  $M$ ,  $U$  je lim. bod  $N$ ,  $g: M \rightarrow N$ ,  $f: N \rightarrow \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow A} g(x) = U, \quad \lim_{x \rightarrow U} f(x) = L. \quad \text{Potom složená funkce má lim} \quad \lim_{x \rightarrow A} f(g(x)) = L,$$

průběh když je splněn jeden z podmínek:

1) Když  $U \in N$ , pak  $f(U) = L$  (spojitost)

2)  $\exists \delta: U \notin g[\mathcal{I}(A, \delta) \cap M]$  (Vyhýbání se vlastní limitě)

### 6) Heineho definice spojitosti

Funkce  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitá v bodě  $a \in M \subset \mathbb{R} \iff$

$$\forall (a_n) \subset M: \lim a_n = a \implies \lim f(a_n) = f(a)$$

### 6) Blumbergova věta

Nechť  $A \subset B, C$ .  $f: B \rightarrow C$ .  $f|_A: A \rightarrow C$   
 $\forall x \in A: f|_A(x) = f(x)$

$\forall f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \exists M \subset \mathbb{R}$  hustá v  $\mathbb{R}$ , že restrikce  $f|_M$  je spojitá funkce.

### 6) Počet spojitých funkcí

$$\exists \text{ bijekce } h: \mathbb{R} \rightarrow C(\mathbb{R})$$

Což je množina všech spojitých reálných funkcí

### 7) Derivace složené funkce

Nechť  $a \in M \subset \mathbb{R}$  je lim. bod  $M$ ,  $g: M \rightarrow N$  spojitá v  $a$ ,  $g'(a) \in \mathbb{R}^*$  a taková, že  $g(a) \in N$  je lim. bod  $N \subset \mathbb{R}$ , nechť  $f: N \rightarrow \mathbb{R}$  je s  $f'(g(a)) \in \mathbb{R}^*$ .

Pak složená funkce  $f(g): M \rightarrow \mathbb{R}$  má derivaci:

$$(f(g(a)))' = f'(g(a)) \cdot g'(a), \text{ jeli tento součin definován.}$$

### 7) Derivace inverzní funkce

Nechť  $a \in M \subset \mathbb{R}$  je lim. bod  $M$ ,  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$  je prostá s  $f'(a) \in \mathbb{R}^*$  a inv.  $f^{-1}: f[M] \rightarrow M$  je spojitá v  $b := f(a)$ .  
 Potom platí následující:

1) Když  $f'(a) \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , pak  $f^{-1}$  má derivaci  $= \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$

2) Když  $f'(a) = 0$  a  $f$  roste/klesá v  $a$ ,  $(f^{-1})'(b) = +\infty / -\infty$

3) Když  $f'(a) = \pm \infty$  a  $b$  je lim. bod  $f[M]$ , pak  $(f^{-1})'(b) = 0$ .

## 8) L'Hospitalovo pravidlo

→ Platí i pro leví okoli:

$A \in \mathbb{R}$ , pro  $\delta$  jsou  $f, g: P^+(A, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$  funkce mající  $f', g'$  na  $P^+(A, \delta)$ ,  $g' \neq 0$  na  $P^+(A, \delta)$  a platí:

1)  $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = \lim_{x \rightarrow A} g(x) = 0$  nebo

2)  $\lim_{x \rightarrow A} g(x) = \pm \infty$  Potom:  $\lim_{x \rightarrow A} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow A} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  pokud poslední limita existuje.

## 9) Konvexita a konkavitita $\vee f''$

Nechť  $I \subset \mathbb{R}$  je int,  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  spojitá s  $f''(b) \in \mathbb{R}^*$  pro  $\forall b \in I^\circ$ . Pak platí:

1)  $f'' \geq 0$  ( $\leq 0$ ) na  $I^\circ$ , pak  $f$  je na  $I$  konvexní (konkávní).

2) Pokud jde o ostré nerovnosti, mluvíme o výřez konvexitě/konkavitě.

## 10) Zbytek TP

Nechť  $n \in \mathbb{N}_0$ ,  $f: U(a, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$  a  $\exists$  vlastně  $f^{(n+1)}: U(a, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ . Pak platí:

1) Lagrangeův zbytek:  $\forall x \in P(a, \delta) \exists c$  mezi  $a$  a  $x$ :

$$R_n^{f, a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (x-a)^{n+1}$$

2) Cauchyův zbytek:  $\forall x \in P(a, \delta) \exists c$  mezi  $a$  a  $x$ :

$$R_n^{f, a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(c) \cdot (x-c)^n}{n!} \cdot (x-a)$$

## 11) Bellmanův číselník

$\forall x \in (-1, 1)$  platí:

$$e^{e^x - 1} = \exp(\exp(x) - 1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n \cdot x^n}{n!}, \text{ kde } B_n \text{ je počet mohladi v prvních } n \text{ možností.}$$

## 12) Riemann = Newton

Nechť  $a < b \in \mathbb{R}$ ,  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  je spoj. funkce a  $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  je prim. k  $f$ .

Pak:  $\lim_{\rho \rightarrow 0} R(P, f, f) = F(b) - F(a).$

## 10) Integrace substitucí

Pokud jsou  $I, J \subset \mathbb{R}$  rektivními intervaly,  $g: I \rightarrow J$ ,  $f: J \rightarrow \mathbb{R}$  a  $g$  má na  $I$  vlastní  $g'$ , pak platí následující:

1) Pokud  $F = \int f$  na  $J$ , pak:

$$F(g) = \int f(g) \cdot g' \text{ na } I$$

2) Pokud je  $g$  surjektivní a  $g' \neq 0$  na  $I$ , pak platí:

$$G = \int f(g) \cdot g' \text{ na } I \Rightarrow G(g^{-1}) = \int f \text{ na } J.$$

## 11) (N) $\int_A^B$ přes porty

$$[F]_A^B := \lim_{x \rightarrow B} F(x) - \lim_{x \rightarrow A} F(x)$$

Uvažme  $f, g, F, G: (A, B) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A < B \in \mathbb{R}^*$ ,  $F$  prim. k  $f$ ,  $G$  prim. k  $g$ . Pak:

$$(N) \int_A^B f g = [FG]_A^B - (N) \int_A^B F g$$

platí vždy, pokud jsou dva ze tří členů definováni.

## 12) $\int r(x)$ - racionální funkce

Pro  $r$  racionální  $r(x)$  existuje prim.  $R(x)$ :

$$R(x) = r_0(x) + \sum_{i=1}^k s_i \cdot \log(|x - \alpha_i|) + \sum_{i=1}^l t_i \cdot \log(q_i(x)) + \sum_{i=1}^m u_i \cdot \arctan(b_i(x)),$$

kde  $r_0(x)$  je rac. funkce,  $k, l, m \in \mathbb{N}_0$ , předný součet = 0,  $s_i, t_i, u_i \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha_i \in \mathbb{Z}(r)$ ,  $q_i(x)$  jsou ireducibilní trojčluny a  $b_i(x)$  jsou reálné nekonečné lin. polynomy:

$$R(x) = \int r(x) \text{ na } \forall I \subset \text{Def}(r)$$

## 12) O restrikcích

Jestliže  $a < b < c \in \mathbb{R}$  a  $f: [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ , pak:

$$f \in R(a, c) \Leftrightarrow f \in R(a, b) \wedge f \in R(b, c)$$

$$\text{v kladném případě: } \int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$$

## 12) Lebesgueova

$\forall f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  platí:

$$f \in R(a, b) \Leftrightarrow f \text{ je omezená a } OC(f) \text{ má min } 0.$$

$M \in \mathbb{R}$  má min 0, pokud  $\forall \varepsilon \in [a, b]$   $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_n < b_n$ :  $M \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$  a  $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) < \varepsilon$

### 13) Riemann = Darboux

Funkce  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  je:

$$f \in R(a, b) \Leftrightarrow \int_a^b f = \overline{\int_a^b f} \in \mathbb{R}.$$

$$\forall \text{ úložítem příslušně platí: } (R) \int_a^b f = \underline{\int_a^b f} = \overline{\int_a^b f}.$$

### 13) HL $\int_a^b N \int$

Nechť  $a < b \in \mathbb{R}$ ,  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitá a  $F' = f$  v  $(a, b)$ .

Pak  $f \in HL(a, b)$  a:

$$(HL) \int_a^b f = F(b) - F(a) = (N) \int_a^b f$$

### 13) Lemma 2

Nechť  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a < b \in \mathbb{R}$ ,  $f$  má prim.  $F: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ , nechť  $f \in R(a, b)$ .

Pak existují:  $F(a) := \lim_{x \rightarrow a} F(x)$ ,  $F(b) := \lim_{x \rightarrow b} F(x) \in \mathbb{R}$ :

$$(R) \int_a^b f = F(b) - F(a) = (N) \int_a^b f$$

### 13) Délka grafu

Nechť  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  spojitá s vlastní  $f' \in R(a, b)$ . Funkce  $f$  má vektorizovaný graf s délkou  $L(f) = \int_a^b \sqrt{1 + (f')^2}$

### 13) Integrální kritérium

Nechť  $m \in \mathbb{N}$ ,  $f: [m, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  je nezáporná a klesající. Potom řada:

$$\sum_{n=m}^{\infty} f(n) \text{ konverguje} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{\infty} f < +\infty$$