

Trzení Heineho definice: Funkce $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá v bodě $a \in M \subset \mathbb{R}$, právě když

$$\forall (a_n) \subset M: \lim a_n = a \Rightarrow \lim f(a_n) = f(a)$$

Pro limitní body dokázáno v trzení „o spojitosti v (limitním) bodě“, pro izolované body dokázáno v trzení „o spojitosti v ic. bodě“, obě z minulé přednášky.

Pak všude $\lim a_n = a$ znamená, že $a_n = a \ \forall n \geq n_0$. Tedy i $f(a_n) = f(a)$

Spojitosť na množině: Necht' je $M \subset \mathbb{R}$ a $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. Funkce f je spojitá (na M),
jeli spojitá v každé množině M .

Husté množiny: Necht' je $N \subset M \subset \mathbb{R}$. Řekneme, že množina N je hustá v množině M ,
když $\forall a \in M \ \forall \delta: U(a, \delta) \cap N \neq \emptyset$.

Trzení: Hustota a spojitost: Necht' $N \subset M \subset \mathbb{R}$, množina N je hustá v M a $f, g: M \rightarrow \mathbb{R}$
jsou takové dvě spoj. funkce, že $\forall x \in N: f(x) = g(x)$.
Potom $f = g$, takže se funkce úplně shodují.

Necht' $y \in M$ je limitní bod a $(a_n) \subset N$ je posloupnost s $\lim a_n = y$.

$$\text{Pak } f(y) = f(\lim a_n) = \lim f(a_n) = \lim g(a_n) = g(\lim a_n) = g(y)$$

→ Takže platí rovnost f a g na N .

Polud' $A \subset B, C$ jsou množiny a $f: B \rightarrow C$ je funkce. Pak zúžením na A je funkce $f|_A: A \rightarrow C$
 $\forall x \in A: (f|_A)(x) := f(x)$

Věta H. Blumberg: Pro každou funkci $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ existuje taková množina $M \subset \mathbb{R}$ hustá v $\mathbb{R}$,
že restrikce $f|_M$ je spojitá funkce.

Věta Cantor-Bernsteinova: Když existují prostá zobrazení $f: X \rightarrow Y$ a $g: Y \rightarrow X$, pak existuje bijekce
Tu lze navíc zvolit tak, že $\forall x \in X$ se $h(x) = f(x)$ nebo $h(x) = g^{-1}(x)$ $h: X \rightarrow Y$.

Ukolik je spojitých funkcí $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$? Stejně jako je reálných čísel.

Věta Počet spojitých funkcí: $\exists$ bijekce $h: \mathbb{R} \rightarrow C(\mathbb{R})$ Pro $M \subset \mathbb{R}$
 $\hookrightarrow C(M) = \{ f: M \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ je spojitá} \}$
Stačí najít injekce $f: \mathbb{R} \rightarrow C(\mathbb{R})$ a $g: C(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$

Věta o nejbížíší mzebnost: Necht' $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je spojité funkce a $f(a) < c < f(b)$ nebo $f(a) > c > f(b)$. Pak

$$\exists d \in (a, b): f(d) = c$$

Předpokládáme zmiňovanou nerovnost. Necht' $A := \{x \in (a, b) \mid f(x) < c\}$ a $d := \sup(A) \in (a, b)$.

Číslo d je korektně definováno, protože množina A je neprázdná a shora omezená.

Ukážeme, že $f(d) < c$, tak $f(d) > c$ vede ke sporu, tedy pouze $f(d) = c$.

Ze spojitosti funkce f v a a v b plyne, že $d \in (a, b)$. Necht' $f(d) < c$.

Ze spojitosti funkce f v d plyne, že $\exists \delta$, že $x \in U(d, \delta) \cap (a, b) \Rightarrow f(x) < c$.

Pak ale A obsahuje větší čísla než d , tedy spor s tím, že d je horní mze množiny.

Necht' $f(d) > c$. Ze spojitosti f v d plyne, že $\exists \delta$, že $x \in U(d, \delta) \cap (a, b) \Rightarrow f(x) > c$.

Pak ale $\forall x \in (a, d)$ dostatečně blízko d leží mimo A , tedy spor s tím, že d je nejmenší horní mze množiny A .

Důsledek Spojitý obraz intervalu: Necht' $I \subset \mathbb{R}$ je interval a $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ je spoj. funkce.

Pak $f[I] = \{f(x) \mid x \in I\} \subset \mathbb{R}$ je též interval.

Důsledek Spojitost a prostota na intervalu: Necht' $I \subset \mathbb{R}$ je interval a $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá prostá funkce. Potom f je buď rostoucí nebo klesající.

Ukážeme, že buď rostoucí ani klesající, musí platit pro $a < b < c$, že

$f(a) < f(b) > f(c)$ nebo $f(a) > f(b) < f(c)$. V případě 1 se říká d splňující:

$f(a), f(c) < d < f(b)$ nějaké hodnoty $d = f(x) = f(y)$ pro $x \in (a, b)$ a $y \in (b, c)$, což

je spor s prostotou funkce. Druhý případ je obdobný.

> věta o nejbížíší mzebnost

Kompaktní množina: Množina $M \subset \mathbb{R}$ je kompaktní, když $\forall (a_n) \subset M$ má konvergentní podposl. (a_{n_k}) s $\lim a_{n_k} \in M$.

Věta Princip minimum a maximum: Necht' $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdná kompaktní množina

a $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá funkce. Pak existují body $a, b \in M$ t. z.:

$\forall x \in M: f(a) \leq f(x) \leq f(b)$. Tedy f nabývá na a minimum, na b maximum.

Dokládáme existenci maximální funkce f . Patrně $f[M] \neq \emptyset$ a uvažujeme, že je shora omezená.

Uděláme uvažujeme, existoval by posloupnost $(a_n) \subset M$, že $\lim a_n = +\infty$. Podle kompaktnosti M máme konvergentní podposl. (a_{n_k}) s $a := \lim a_{n_k} \in M$. Pak ale i $\lim a_n = +\infty$.

To je ale spor s $\lim (a_{n_k}) = f(a)$. Lze tedy def. $s := \sup(f[M]) \in \mathbb{R}$

a podle definice $\sup$ existuje $(a_n) \subset M$ s $\lim f(a_n) = s$. Díky kompaktnosti M má (a_n) konvergentní podposloupnost (a_{n_k}) s $b := \lim a_{n_k} \in M$. Pak $\lim f(a_{n_k}) = f(b) = s$. Heineho definice

Protože s je horní mez množiny $f[M]$, je $f(b) \geq f(x) \forall x \in M$.

Globální a lokální: Necht' je $a \in M \subset \mathbb{R}$ a necht' $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. Funkce f má v a v M globální maximum (minimum), když:

$$\forall x \in M: f(x) \leq f(a) \quad (f(x) \geq f(a)).$$

lokální maximum (minimum), když

$$\exists \delta \forall x \in U(a, \delta) \cap M: f(x) \leq f(a) \quad (f(x) \geq f(a)).$$

Stejně tak existuje ostrý maximum, pokud jde o ostré nerovnosti.

Omezená množina: $M \subset \mathbb{R}$ je omezená: $\exists c \forall a \in M: |a| < c$.

Je uzavřená, pokud $\forall (a_n) \subset M: \lim a_n = a \Rightarrow a \in M$.

Je otevřená, pokud $\forall a \in M \exists \delta: U(a, \delta) \subset M$. $\Rightarrow$ tedy že do té množiny patří i body "doko"

Věta: Uzavřená množina: Množina $M \subset \mathbb{R}$ je uzavřená $\Leftrightarrow$ množina $\mathbb{R} \setminus M$ je otevřená.

$$\mathbb{R} \setminus M \text{ není otevřená} \Leftrightarrow \exists a \in \mathbb{R} \setminus M \forall \delta: U(a, \delta) \cap M \neq \emptyset.$$

Ekvivalentně existuje bod $a \in \mathbb{R} \setminus M$ a posl. $(a_n) \subset M: \lim a_n = a$. Ekvivalentně, M není uzavřená.

Věta: Struktura otevřených množin: Množina $M \subset \mathbb{R}$ je otevřená $\Leftrightarrow \exists$ systém otevřených intervalů $\{I_j, j \in X\}$, že indexová množina X je nejvýše spočetná, intervaly I_j jsou vzájemně disjunkt a $\bigcup_{j \in X} I_j = M$

Uzavřená množina je tak doplněním otevřených množin. Čili jde o sjednocení "množin" mezi krajními intervaly.

Polnost $|X| = n \in \mathbb{N}$, pak těchto množin je nejvýše $n+1$.

Věta Kompaktnost množin: Množina $M \subset \mathbb{R}$ je kompaktní $\Leftrightarrow M$ je omezená a uzavřená.

Necht' je $M \subset \mathbb{R}$ omezená a uzavřená a $(a_n) \subset M$ je lib. posl. Protože (a_n) je omezená, má podle Bolzano-Weierstrasse konvergentní podposl. (a_{n_k}) s $a := \lim a_{n_k} \in \mathbb{R}$.

Protože $a \in M$ (M je uzavřená) $\Rightarrow M$ je kompaktní.

Necht' M není omezená. Sestrojíme $(a_n) \subset M$ t.č. $|a_m - a_n| > 1 \quad \forall m, n: n \neq m$.

Takovou vlastnost by sdílela i libná podposloupnost, tedy by žádná nebyla konvergentní,

tudíž by M nebyla kompaktní. Proti $a_1 \in M$ zvolíme náhodně, abylo necht' jsou již definovány s podobnou výš. Protože M není omezená, $\exists a_{n+1} \in M$ t.č. $|a_{n+1}| > 1 + \max(|a_1| \dots |a_n|)$, pak platí $|a_{n+1} - a_i| > 1 \quad \forall i$. Takto Takto definujeme celou (a_n) .

Necht' není $M \subset \mathbb{R}$ uzavřená. Pak $\exists$ konvergentní posl. $(a_n) \subset M$ s $a := \lim a_n \in \mathbb{R} \setminus M$.

Stejnou limitu a má i libná její podposl., která tedy nemá limitu v M . Tedy M není kompaktní.

$\Rightarrow$ protože není uzavřená.

Tvrzení Antimatická spojitost: Necht' je $M \subset \mathbb{R}$ a $f, g: M \rightarrow \mathbb{R}$ jsou spojité funkce.

Potom součet a součin funkcí je spojitý.

$$f+g, f-g: M \rightarrow \mathbb{R}, \quad f/g: M \rightarrow \mathbb{R}$$

Důkaz jen pro podíl:

Necht' $a \in M$ je lib. bod a $(a_n) \subset M$ je lib. posl. s $\lim a_n = a$.

Podle Heineho definice je $\lim f(a_n) = f(a)$, $\lim g(a_n) = g(a)$.

Podle věty o antimatické posl. je:

$$\lim (f/g)(a_n) = \lim f(a_n)/g(a_n) = \lim f(a_n)/\lim g(a_n) = f(a_n)/g(a_n) = f(a)/g(a).$$

Podle Heineho definice je f/g spojitý v bodě a .

Racionální funkce $r(x)$: je podíl dvou polynomů, tedy funkce ve tvaru:

$$r(x) = \frac{a_m x^m + \dots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + \dots + b_1 x + b_0} : M \rightarrow \mathbb{R}, \text{ kde } a_i, b_i \in \mathbb{R}, m, n \in \mathbb{N}_0, a_m b_n \neq 0,$$

v čitateli používáme identický nulový polynom.

Def. vlna M je: $\mathbb{R} \setminus \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$, kde $z_i \in \mathbb{R}$ je

veslaj kořen polynomu ve jmenovateli.

Důsledek Spojitost rac. funkcí: Každá racionální funkce je spojitá ve všech def. obz.

Vyjde z toho, že lineární identita $f(x) = x$ i konstantní $f(x) = c \in \mathbb{R}$ je spojitá na $\mathbb{R}$, pak opakováním použití předchozího plyne spojitost racionální funkce.

Věta Spojitost a složená: Necht' $M, N \subset \mathbb{R}$ a $g: M \rightarrow N$ a $f: N \rightarrow \mathbb{R}$ spojitá.

Pak i složená funkce $f(g): M \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá.

Neht' $a \in M$ a $(a_n) \subset M$ je lib. posl. s $\lim a_n = a$. Podle Heineho def.

je $\lim g(a_n) = g(a)$ a také $\lim f(g)(a_n) = \lim (f(g(a_n))) = f(g(a)) = f(g)(a)$.

Heineho definice zároveň říká, že je $f(g)$ spojitá v bodě a .

Věta Spojitost inverze: Necht' $M \subset \mathbb{R}$ a neht' $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá prostá funkce.

Inverze $f^{-1}: f[M] \rightarrow M$ je spojitá, pokud:

a) M je kompaktní

b) M je interval

1) Neht' M je kompaktní, $b \in f[M]$, $(b_n) \subset f[M]: \lim b_n = b$.

Položíme $a := f^{-1}(b) \in M$ a $a_n := f^{-1}(b_n) \in M$. Položíme, že $\lim a_n = a$.

Neht' (a_n) je posl. $(a_n) \subset M$ s $\lim a_n = L \in \mathbb{R}^*$. Ale $L \in M$, protože M je uzavřený, omezený.

Podle Heineho definice je $\lim f(a_n) = f(L) = b$, protože (a_n) je posloupnost (b_n) .

Vzhledem k prostotě f se $L = a$. Tím pádem (a_n) má dvě posl.

s rozdílnými limity, takže $\lim a_n = a$. —> Inverze „spojitost na intervalu“

2) Neht' M je interval. Pak f musí být rostoucí nebo klesající. Neht' je klesající (Rostoucí je obdobné).

Podle (spojitost obz. intervalu) je $f[M]$ také interval. Neht' $b \in f[M]$ a neht' je číslo ε .

Ukážeme, že f^{-1} je zprava spojitá v b . Triviálně to platí, pokud b je pravý konec intervalu.

Neht' b není pravý konec intervalu. Protože f^{-1} je klesající, $a := f^{-1}(b) \in M$ není pravý konec intervalu M a můžeme předpokládat, že ε je tak malé, že $\langle a - \varepsilon, a \rangle \subset M$.

Položíme $\delta := f(a - \varepsilon) - f(a) = f(a - \varepsilon) - b$. Protože f^{-1} je klesající, posbí

$\langle b, b + \varepsilon \rangle \subset f[M]$ do $\langle a - \varepsilon, a \rangle \subset M$.

Tedy $f^{-1}[U^+(b, \delta) \cap f[M]] \subset U(f^{-1}(b), \varepsilon) = U(a, \varepsilon)$ a f^{-1} je zprava spojitá v b .

Zlom se dolů stěhuje, takže je spojitá v bodě.