

Přednáška po dvou týdnech volna.

Statistika

$$X_1 - X_n \sim F_v \quad \text{n.n.v. se stejným rozdělením}$$

to je popsané d.f. F_v , $v \dots$ parametr

$$\text{Pois}(\lambda) \quad v = \lambda$$

$$N(\mu, \sigma^2) \quad v = (\mu, \sigma)$$

Def: Bodové odhady

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \quad \dots \text{výběrový průměr}$$

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \quad \dots \text{skoro jako rozptyl, jen}$$

to děláme přes střední hodnotu,
nikl výběrový průměr. (a proto $\frac{1}{n-1}$ místo $\frac{1}{n}$)

Thm:

1) $\bar{X}_n$ je konzistentní nezávislý odhad pro $E(X_1)$

2) S_n^2 je $\rightarrow$ pro $\text{Var}(X_1)$

$$E \bar{X}_n = EX$$

odhad skutečnost

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} X_n$$

MSE: (mean-square-error)

$$= E(\bar{X}_n - EX)^2 \quad \rightarrow \text{chceme co nejmenší.}$$

Def: Intervalové odhady

funkce těchto měřených veličin $X_1 - X_n$

- Určíme dvě statistiky T_1, T_2

→ ten parametr ν může být dvojznamenný

$$P(T_1 < \underbrace{g(\nu)} < T_2) = 1 - \alpha, \text{ např.: } 95\%$$

$g(\nu) \in \underbrace{\langle T_1, T_2 \rangle}$ s velkou pravděpodobností.
int. odhad

Thm: Int. odhad norm. m.h. veličiny

$$X_1 - X_n \sim N(\nu, \sigma^2) \rightarrow \text{známe}$$

$$\Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$$

$$C_n = \langle \bar{X}_n - \delta, \bar{X}_n + \delta \rangle, \text{ kde } \delta = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot z_{\alpha/2}$$

$$\text{Potom } P(C_n \ni \nu) = 1 - \alpha$$

Ok:

Chceme otestovat: $\bar{X}_n - \delta \leq \nu \leq \bar{X}_n + \delta$



$$-\delta \leq \bar{X}_n - \nu \leq \delta$$

$$-z_{\alpha/2} \leq \underbrace{\frac{\bar{X}_n - \nu}{\sigma/\sqrt{n}}}_{Y_n} \leq +z_{\alpha/2}$$

Y_n v cent. lim. větě... standardizace $\bar{X}_n$

$$Y_n \sim N(0, 1)$$

$$P(-z_{\alpha/2} \leq Y_n \leq +z_{\alpha/2}) = \Phi(z_{\alpha/2}) - \Phi(-z_{\alpha/2}) = (1 - \alpha/2) - \alpha/2 = 1 - \alpha$$



Co kdybychom měli σ^2 ?

$$X_1 - X_n \sim \bar{X}_n \dots \text{odhad } \mu$$
$$\hat{S}_n^2 \dots \text{odhad } \sigma^2$$

asi chceme: $\delta = \frac{\hat{S}_n}{\sqrt{n}} \cdot 2\alpha_{1/2}$ a vzít interval $\langle \bar{X}_n - \delta, \bar{X}_n + \delta \rangle$

hudební zharmonik n.v. $\frac{\bar{X}_n - \mu}{\hat{S}_n / \sqrt{n}} \rightarrow X_1 - X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$

Def: Studentova distribuce (neboli t-distribuce)

distr. fce: Ψ_{n-1} studentova modelová s $(n-1)$ stupni volnosti.

tedy: $\delta = \frac{\hat{S}_n}{\sqrt{n}} \cdot 2\alpha_{1/2}$, kde $2\alpha_{1/2}$ t.č. $\Psi_{n-1}(2\alpha_{1/2}) = 1 - \alpha_{1/2}$

pak v důkazu:

$$P(-2\alpha_{1/2} \leq Y_n \leq 2\alpha_{1/2}) = \Psi(2\alpha_{1/2}) - \Psi(-2\alpha_{1/2})$$

Pozn: to „n“ je celkový počet měření. Musí být > 1 , abyoh vůbec měl možnost spočítat rozptyl. Zároveň čím více měření, tím víc se přibližím $N(0,1)$.

Testování hypotéz

Př: Zajímá nás, jestli $\# \varphi \stackrel{?}{=} \# \sigma^?$ $\rightarrow$ množinách...

Udaly by to bylo stejné v průměru, tak potom v každém nze je

- $\sigma^? > \varphi$ s psk $\frac{1}{2}$
- $\sigma^? < \varphi$ s psk $\frac{1}{2}$
- $\sigma^? = \varphi$ s psk 0

Výsle: v 82 po celé jednových letech $\# \sigma^? > \# \varphi$

Proč? To se stane náhodně na $\left(\frac{1}{2}\right)^{82}$ $\rightarrow$ což je velmi malé číslo.

A je velmi nepravděpodobné, že by ohom byli středky takové „náhodny“.

Co pak ale s odchylkami od průměru?

Postup proti švindlům s hypotézou:

Nulová hypotéza: H_0 „default“ ... mince je spravedlivá (obě strany padají stejně často)

alternativní hypotéza: H_1 „objev“ ... mince je cizlová

Buď zamítneme H_0 , nebo nebudeme, že nevíme.

1) Vybereme vhodný model

2) Vybereme α , např.: 0,05

3) Určíme testovou statistiku $T \sim \text{fnc } h(X_1 - X_n)$

4) Určíme kritický obor W

5) Naměříme data $x_1 - x_n \in \mathbb{R} \rightarrow$ měříme až nalovíme, abychom nepředpokládali úplně špatný model

6) Zamítneme H_0 , pokud $t = h(\underbrace{x_1 - x_n}_{\text{naměřené hodnoty}}) \in W$

$\alpha = P(\text{zamítneme } H_0, \text{ když platí}) \sim$ chyba I. druhu. $\rightarrow$ falešně rozhodneme, že mince je cizlová.

$\beta = P(\text{nezamítneme } H_0, \text{ i když neplatí}) \sim$ chyba II. druhu. $\rightarrow$ falešně ignorujeme, že mince je cizlová.

Obecně volíme α (vzhledem k oboru a pokusům),

spočítáme n , aby β bylo průměrně malé.

$(1-\beta)$... síla testu. $\sim$ čím více měření, tím zjevně silnější.

Př.: Hráme miny, chceme je ztestovat

H_0 : mince je spravedlivá.

1) $X_1 - X_n \sim \text{Bern}(p)$


2) $\alpha = 0,05$

3) $T = X = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n, \frac{1}{2})$ $\rightarrow$ předpokládáme, že H_0 platí.

4) $W = \{0, \dots, k\} \cup \{n-k, \dots, n\} \sim$ ten součet by měl být někde okolo středu (oboustranný test)

5)

$$\binom{n}{k} \frac{1}{2^n}$$



$\rightarrow$ pozor, není to norm. roz., je to disk.

Jaká je $P(\text{chyba I. druhu})$?

$$= P(\text{Bin}(n, \frac{1}{2}) \leq h) + P(\text{Bin}(n, \frac{1}{2}) \geq n-h) \stackrel{\text{tabulka chyb}}{=} \alpha$$

- když $n=1000$, 472 orel, 528 prama. Jaký je výsledek?

pro $\alpha=0.05$ je $h=469$, tedy jsme hodně blízko.

Def: p -hodnota:

- místo True/False přijmout vyjádření, jak moc/uně jsem od hypotézy.

$:=$ pravděpodobnost, že výsledky dopadnou „ $\geq$ “ než je naše měření.

Pokud p -hodnota je menší než α , zamítáme H_0 .