


Mějme graf  $G$  reprezentující město (jako na cvičení – křižovatky jsou vrcholy, ulice jsou hrany). Analýzou policejních dat bylo zjištěno, že naprostá většina zločinů je páchána přímo na křižovatkách. Protože bychom chtěli ušetřit za mzdy strážníků, změněme podmínku pro hlídání města – bude nám stačit, aby z každé křižovatky bylo vidět nějakého strážníka (Tedy aby pro každý vrchol bez strážníka platilo, že strážník byl umístěn v alespoň jednom z jeho sousedů). Zadáni problému opět zní, zda dokážeme dané město uhlídat pomocí  $k$  strážníků. Dokažte že tento problém a SAT jsou na sebe vzájemně převoditelné.

## Ukonstruace přechodu:



(A)

pro  $x_l \in V$ :

pro  $\{i, j\} \in E: i=l \vee j=l$

$\neg x_l \Rightarrow (x_i \vee x_j)$

$x_l \vee x_i \vee x_j$   
 $F_{l,1}$

→ pokud vrchol je incidentní s hranou, co je incidentní s policiistou.

Policiista není bude

přímo na vrcholu, nebo na hraně přilehlé

Uložný vrchol musí být hlídán

V grafu  $G=(V, E)$ :

$C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_M$

pro  $x_l \in V$ :

$F_{l,1} \vee F_{l,2} \vee \dots \vee F_{l,|\{i,j\} \in E: i=l \vee j=l|}$

$C_k$

Ještě musíme zajistit, aby bylo

(B)

strážníků právě  $k$ . Opět pomocí tabulky:

Ve sloupci max 1: pro  $1 \leq i, i' \leq h, 1 \leq j, j' \leq n$


$P_{ij} \Rightarrow \neg P_{i'j} \sim \neg P_{ij} \vee P_{i'j}$

V řádku max 1:

$P_{ij} \Rightarrow \neg P_{ij'} \sim \neg P_{ij} \vee P_{ij'}$

V řádku alespoň 1:

$P_{i1} \vee P_{i2} \vee \dots \vee P_{in}$



(C) + celé obhromady:

$P_{ij} \Rightarrow x_j$

Celá formule se bude skládat z literálů, které vznikly v částech (A), (B), (C) přes všechna určená města.

Nejdříve vytvořím literály, které pomocí implikace vyjádřím, aby každý vrchol měl alespoň 1 sousední vrchol s policiistou. (A)

Následně pomocí tabulky vwx zjistím, aby vždy bylo nějakých  $k$  disjunktivních vrcholů obsazeno. (B)

Sjednotím všechny literály do jedné formule (C)

## Důkaz přechodu:

Stejně jako p. Hinc na přednášce  
doložil, že odpověď AND se zachová  
a že převod je polynomiální.

### d) Polynomiálnost převodu:

- Klauzule vytváříme iterací přes všechny incidentní hrany umístí itence přes vrcholy.
  - tedy  $O(n^2)$  čas, prostor pak také  $O(n^2)$ .
- Následně vytváříme klauzule pro tabulku  $n \times k$ , kde iterují přes řádky a sloupce  
a pro každou pozici následně vytváříme klauzule ostatních řádků a sloupců,  
tedy  $O(n^4)$ .

Celkem tedy alg. převodu běží v  $O(n^4)$ . Můžeme tedy i jako inverz považovat za polynomiální.

### e) Zpracování odpovědi:

Chceme: Existuje rozmístění k-policijů  $\Leftrightarrow$  Formule je splnitelná.

$\Leftarrow$ : Pak musí existovat právě k pozitivních literálů (podle tabulky),  
které zároveň splňují jednotlivé  $C_n$ , takže splňují podmínku zadaní,  
podle které je  $C_n$  klauzule tvořena.

$\Rightarrow$  Pak jsou literály obsahující všechny  $C_n$  vzhledem k definici a záměně  
budou splňovat „tabulkové“ klauzule, tedy celá formule bude splnitelná. ☒

Čili máme hotový převod **Policijů  $\rightarrow$  SAT**.

# Nyní SAT → Policijt:


Povíjij převod SAT → 3-SAT e předvíšlog:

Pak formule vypadá následovně:  $(l_1 \vee l_2 \vee x_1) \wedge (\bar{x}_1 \vee l_3 \vee x_2) \wedge (\bar{x}_2 \vee l_4 \vee x_3) \wedge \dots \wedge (\bar{x}_{i-3} \vee l_{i-1} \vee l_i)$ ,  
kde  $l_i$  jsou původní literály formule a  $x_i$  jsou pomocné proměnné převodu

Chci policijtum řešit SAT. SAT je řešitelný  $\Leftrightarrow$  existuje model k policijtum

(A) Jednotlivé proměnné budou reprezentovat v grafu tímto trojúhelníkem:

kde  $x, \bar{x}$  jsou ohodnocení proměnné, 3-úhel je pomocný,  
který vyznačuje ohodnocení (obsazení) proměnných literálů namísto vrcholů klauzul  
a ..... je hran, kterou budou spojuvat jednotlivé klauzule.




Vytvořím si takový  $\Delta$  pro každou proměnnou.

Následně budu mít formuli (nyní už máme 3-SAT). Každou klauzuli budu reprezentovat jako jeden vrchol, který hranami spojuji do trojúhelníků proměnných, které klauzule obsahuje, a to i s ohledem na hodnotu literálu ( $x/\bar{x}$ ).  
Vrcholy reprezentující klauzule spojuji do jednoho řetězce.

(B) Následně se zeptám, zdali je takový graf uhlídit k policijtum, kde  $k = \#$  proměnných  
Pokud AND, SAT formule je splnitelná, pokud NE, SAT formule je nesplnitelná.

Jednoduchý příklad pro ilustraci:



$$c_1 \quad c_2$$

$$\neg x \wedge x \quad k=1$$

Nejde policijt

$$\neg x \wedge \neg x \quad k=1$$

Lze policijt!

## Důležité:

1) Preved je polynomální:

jelikož v čase  $O(n+m)$

potrze tvorí rod grafy

a spojné vrcholy hlauvnlí.

2) Zachováva odpověď:

SAT je splnitelný, pokud existuje umístění  $k$  proměnných, které splní všechny klauzule.

Pokud je SAT splnitelný, jsou všechny klauzule  $(C_1 - C_n)$  hlíčing. Máme všeh jen  $k$ -stránka, kde  $k = \#$  proměnných, tedy abychom obličal i všechny  $\Delta$ , musí být poličajit

i na každém trojúhelníku na pozici  $x$  nebo  $\bar{x}$  a to právě 1. ✓

Navrhak pokud lze zkonstruovat graf obličat právě  $k$ -poličajit, kde  $k = \#$  proměnných, pak jsou všechny obličing všechny  $\Delta$  právě 1 poličajit a zároveň jsou hlíčing všechny hlauvnlí vrcholy. Tedy rozložení poličajitů na množech dolance

uvěňuje model teorie definované formuli, jelikož z každého  $\Delta$  (speciálně  $x$  nebo  $\bar{x}$ )

musí vřst hrna do klauzule, které daná proměnná splňuje, tedy zároveň hlíčit. ✓



Mějme vektor  $y$  délky  $n$ , který vznikl rotací vektoru  $x$  o  $c$  pozic. Tedy  $y_j = x_{(j+c) \bmod n}$ . Vyjádřete Fourierův obraz  $F(y)$  pomocí Fourierova obrazu  $F(x)$ .

Řešení úlohy by tedy mohlo být například následující tvrzení včetně důkazu (následující výraz je pouze příklad a neplatí, nesnažte se ho, prosím, dokázat):  $F(y)_j = (j+c) F(x)_{(j+c-2) \bmod n} \forall j \in \{0, 1, \dots, n\}$

Z definice víme:  $F(x) = \sum_{k=0}^{n-1} x_k \cdot w^{jk}$ . Ten výraz si upravím, abych dostal do výrazu konstantu  $e$ . Tedy:

$$F(x)_j = \sum_{k=c}^{n-1+c} x_{k-c} \cdot w^{j(k-c)} \rightarrow F(x)_j = w^{-jc} \cdot \sum_{k=c}^{n-1+c} x_{k-c} \cdot w^{jk}$$

$$F(y)_j = \sum_{k=c}^{n-1+c} x_{k \bmod n} \cdot w^{j(k-c)}$$

$$F(y)_j = x_c \cdot w^0 + x_{c+1} \cdot w^{j \cdot 1} + x_{c+2} \cdot w^{j \cdot 2} + \dots + x_{n-1} \cdot w^{j(n-1-c)} + x_0 \cdot w^{j(n-1-c+1)} + x_1 \cdot w^{j(n-1-c+2)} + \dots + x_{c-1} \cdot w^{j(n-1)}$$

$$\frac{F(x)_j}{w^{-jc}} = x_c \cdot w^{j(2c)} + x_{c+1} \cdot w^{j(2c+1)} + x_{c+2} \cdot w^{j(2c+2)} + \dots + x_{n-1} \cdot w^{j(n-1+c)} + x_0 \cdot w^{jc} + x_1 \cdot w^{j(c+1)} + \dots + x_{c-1} \cdot w^{j(2c-1)}$$

vidíme tu nějaké zvláštní koeficienty

zde jsem si napsal snahu  $F(x)_j$  a  $F(y)_j$ , abych je mohl porovnat. Jakkoli u  $F(x)_j$  jsem díky konstantě sčítání prvního posunul pro lepší přehled

$$F(y)_j = \frac{F(x)_j}{w^{-jc} \cdot w^{2jc}} = \frac{F(x)_j}{w^{jc}}$$

$$\frac{w^{j(2c+1)}}{w^j} = w^{2jc+j-j} = w^{2jc}$$